

# Voir et entendre la gravitation

Pierre Vanhove

*IPHT*  
*Saclay*

---

Lycée Diderot

Langres

2 février 2017

# Première partie I

## La Théorie de la Relativité Générale

*Ça a été la plus heureuse idée de ma vie*

Albert Einstein

En novembre 1915,

Albert Einstein présente sa théorie de la gravitation

Wenn  $g$  ein Skalar ist, dann  $\frac{\partial g_{ik}}{\partial x_j} = T_j$  Tensor 7. Ranges.

$$T_{il} = \left( \frac{\partial T_i}{\partial x_l} - \sum \{i, l, k\} T_k \right) - \sum_{k,l} \left( \frac{\partial \{i, k, l\}}{\partial x_k} - \{l, k\} \{i, l, k\} \right)$$

Tensor

Wichtige

$$\frac{\partial \{i, k\}}{\partial x_k} = \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial x_k} (g_{ik} + g_{ki})$$

Wir setzen voraus


$$- \sum g_{\alpha\beta} \frac{\partial^2 g_{ik}}{\partial x_\alpha \partial x_\beta}$$

$$\text{Formel } \{i, k\} \{l, l\} \{k\}$$

$$= - \sum_{\substack{\alpha \neq \beta \\ \alpha \neq \beta}} g_{\alpha\beta} \left( \frac{\partial^2 g_{ik}}{\partial x_\alpha \partial x_\beta} \right)$$


Hieraus

$$- T^x = \sum_i \left( g_{\alpha\beta} \frac{\partial^2 g_{ik}}{\partial x_\alpha \partial x_\beta} - g_{\alpha\beta} g_{\gamma\delta} \left( \frac{\partial g_{ik}}{\partial x_\alpha} - \frac{\partial g_{i\alpha}}{\partial x_k} \right) \left( \frac{\partial g_{kl}}{\partial x_i} - \frac{\partial g_{li}}{\partial x_k} \right) \right)$$



Révolutionne la conception de l'espace, du temps et du cosmos

# Loi de la chute des corps : Galilée






Galilée affirma l'identité des lois du Ciel et de la Terre.  
Il énonce la première loi de la gravitation :  
Tous les corps tombent de la même façon

# Loi de la chute des corps : Galilée

Tous les corps tombent de la même façon

Vérification **sur la lune** de la loi de la chute des corps **formulée**  
**par Galilée en 1638** **par les astronautes de la mission Apollo 15**

# Loi de la gravitation universelle : Newton



*La même loi d'attraction étant posée, un corpuscule, placé en dehors de la surface sphérique, est attiré par cette surface en raison renversée du carré de la distance de ce corpuscule au centre*


Théorème XXXI Livre 1<sup>er</sup> « Principia » traduction Marquise du Châtelet

$$F_{1-2} = -\frac{G_N m_1 m_2}{d(1,2)^2}$$

# La gravitation chez Jules Verne



Dans « Autour de la Lune » (1870)  
Jules Verne décrit l'influence de  
l'attraction terrestre et lunaire sur le  
projectile Colombiad



*On sait que l'attraction, autrement dit la pesanteur, est proportionnelle aux masses et en raison inverse du carré des distances. De là cette conséquence : si la Terre eût été seule dans l'espace, si les autres corps célestes, se fussent subitement annihilés, le projectile d'après la loi de Newton, aurait d'autant moins pesé qu'il se serait éloigné de la Terre, mais sans jamais perdre entièrement son poids, car l'attraction terrestre se fût toujours fait sentir à n'importe quelle distance.*

# La gravitation chez Jules Verne

*A mesure qu'il s'éloignait de la Terre, l'attraction terrestre diminuait en raison inverse du carré des distances, mais aussi l'attraction lunaire augmentait dans la même proportion.*



# La gravitation chez Jules Verne

*Il devait donc arriver un point où, ces deux attractions se neutralisant, le boulet ne pèserait plus. Si les masses de la Lune et de la Terre eussent été égales, ce point se fût rencontré à une égale distance des deux astres.*



# La gravitation chez Jules Verne

Mais, en tenant compte de la différence des masses, il était facile de calculer que ce point serait situé aux quarante sept cinquante deuxièmes du voyage, soit en chiffres, à soixante dix huit mille cent quatorze lieues de la Terre.

$$d_{\text{Colombiad}} = \frac{D(\oplus - \text{C})}{1 + \sqrt{\frac{M_{\text{C}}}{M_{\oplus}}}} = \frac{47}{52} \times D(\oplus - \text{C})$$



# La gravitation universelle ... mais mystérieuse



Rubrique à Brac © Gotlib - Dargaud

Ni Galilée, ni Newton ne donnent d'explication sur l'origine de la force de gravitation

*J'ai expliqué jusqu'ici les phénomènes célestes et ceux de la mer par la force de gravitation, mais je n'ai assigné nulle part la cause de la gravitation. (Newton)*



# Masse grave et masse inerte

La plume et le marteau touchent le sol au même instant car l'action de la force de gravitation est *indépendante* de leur *masse*

La *masse inerte* s'oppose au changement de vitesse

$$m_{\text{inerte}} \vec{a} = \vec{F}; \quad m_{\text{inerte}} \frac{\vec{v}^2}{2} = E_{\text{cinétique}}$$

# Masse grave et masse inerte

La plume et le marteau touchent le sol au même instant car l'action de la force de gravitation est *indépendante* de leur *masse*

La *masse inerte* s'oppose au changement de vitesse

$$m_{\text{inerte}} \vec{a} = \vec{F}; \quad m_{\text{inerte}} \frac{\vec{v}^2}{2} = E_{\text{cinétique}}$$

La gravitation agit sur la *masse grave*

$$\vec{F}_{\text{gravitation}} = m_{\text{grave}} \vec{g}; \quad E_{\text{potentielle}} = m_{\text{grave}} g h$$

# Masse grave et masse inerte

La plume et le marteau touchent le sol au même instant car l'action de la force de gravitation est *indépendante* de leur *masse*

La *masse inerte* s'oppose au changement de vitesse

$$m_{\text{inerte}} \vec{a} = \vec{F}; \quad m_{\text{inerte}} \frac{\vec{v}^2}{2} = E_{\text{cinétique}}$$

La gravitation agit sur la *masse grave*

$$\vec{F}_{\text{gravitation}} = m_{\text{grave}} \vec{g}; \quad E_{\text{potentielle}} = m_{\text{grave}} g h$$

$\vec{g}_{\text{♠/♣}}$  est l'accélération gravitationnelle sur Terre ou la lune

$$\vec{a} = \frac{m_{\text{grave}}}{m_{\text{inerte}}} \vec{g}_{\text{♠/♣}}; \quad \frac{\vec{v}^2}{2} = \frac{m_{\text{grave}}}{m_{\text{inerte}}} g_{\text{♠/♣}} h + \text{Constante}$$

Si  $m_{\text{inerte}} = m_{\text{grave}}$  les équations sont identiques pour la plume et le marteau

## Le Principe d'équivalence : l'idée merveilleuse d'Einstein



*J'étais assis sur ma chaise au Bureau Fédéral de Berne... Je compris que si une personne est en chute libre, elle ne sentira pas son propre poids. J'en ai été saisi. Cette pensée me fit une grande impression. Elle me poussa vers une nouvelle théorie de la gravitation. (Einstein 1907)*

# La gravitation comme courbure de l'espace-temps

$$\begin{aligned}
 [\mu\nu] &= \frac{1}{2} \left( \frac{\partial g_{\mu l}}{\partial x_\nu} + \frac{\partial g_{\nu l}}{\partial x_\mu} - \frac{\partial g_{\mu\nu}}{\partial x_l} \right) & \frac{\partial}{\partial x_l} [i b] &= \frac{\partial}{\partial x_l} [k b] \\
 (i^k, l^m) &= \frac{1}{2} \left( \frac{\partial^2 g_{im}}{\partial x_i \partial x_l} + \frac{\partial^2 g_{kl}}{\partial x_i \partial x_m} - \frac{\partial^2 g_{il}}{\partial x_k \partial x_m} - \frac{\partial^2 g_{km}}{\partial x_i \partial x_l} \right) & \left. \begin{array}{l} \text{Grassmann} \\ \text{Liesner'scher} \\ \text{Handyfalldyckel} \end{array} \right\} \\
 &+ \sum_{\rho\sigma} \chi_{\rho\sigma} \left( [{}^{\rho\sigma}] [{}^{\kappa\lambda}] - [{}^{\rho\lambda}] [{}^{\kappa\sigma}] \right)
 \end{aligned}$$

Le 25 novembre 1915, Einstein formule la relativité générale, pour cela il doit maîtriser les géométries non-Euclidiennes et le formalisme tensoriel associé


Il devance le grand mathématicien David Hilbert qui déclare



*N'importe quel gamin des rues de Göttingen comprend mieux la géométrie à quatre dimensions qu'Einstein, mais c'est lui qui a fait la révolution conceptuelle de la physique.*

# La gravitation comme courbure de l'espace-temps

$$\begin{aligned}
 \Gamma_{\ell}^{\mu\nu} &= \frac{1}{2} \left( \frac{\partial g^{\mu\ell}}{\partial x_\nu} + \frac{\partial g^{\nu\ell}}{\partial x_\mu} - \frac{\partial g_{\mu\nu}}{\partial x_\ell} \right) & \frac{\partial}{\partial x_\ell} [i\delta] &= \frac{\partial}{\partial x_\ell} [k\delta] \\
 (i\kappa, \ell m) &= \frac{1}{2} \left( \frac{\partial^2 g_{im}}{\partial x_\kappa \partial x_\ell} + \frac{\partial^2 g_{k\ell}}{\partial x_\kappa \partial x_m} - \frac{\partial^2 g_{i\ell}}{\partial x_\kappa \partial x_m} - \frac{\partial^2 g_{km}}{\partial x_\kappa \partial x_\ell} \right) & \left. \begin{array}{l} \text{Christoffel} \\ \text{tensor} \\ \text{Riemann curvature} \\ \text{tensor} \end{array} \right\} \\
 &+ \sum_{\sigma\epsilon} \delta_{\sigma\epsilon} \left( \Gamma_{\sigma}^{im} [\epsilon] - \Gamma_{\sigma}^{kl} [\epsilon] \right) & &
 \end{aligned}$$




L'espace tout entier est la scène du champ gravitationnel :

un corps n'est pas attiré par un autre corps mais se déplace librement dans un espace-temps courbé

# Voir la gravitation




Einstein prédit que la lumière est déviée par le Soleil



Confirmé par Eddington et Dyson avec l'éclipse de 1919



# Voir la gravitation

Einstein prédit que la lumière est déviée par le Soleil



Curieuse illustration dans « Les merveilles des sciences et l'industrie » (Hachette, 1926), où soleil repousse la lumière 😊

# Tests expérimentaux du principe d'équivalence



Le principe d'équivalence, c'est-à-dire l'égalité en masse grave et masse inerte, est testé expérimentalement à la précision

$$\frac{m_{\text{inerte}} - m_{\text{grave}}}{m_{\text{grave}}} \simeq 10^{-13}$$

La collaboration française MICROSCOPE a mis sur en orbite le 25 avril 2016 un satellite pour tester ce principe à une précision de  $10^{-15}$

## Deuxième partie II

### La Gravitation aujourd'hui


*Les physiciens disent des trous noirs qu'à force de se concentrer dans le ciel nocturne, il leur arrive d'enrouler, dans la substance ténébreuse, l'espace qu'ils épanchent dans le temps.*

Pascal Quignard (La barque silencieuse Chap XXV Extase et enstase)

# Trous noirs

En 1916 Karl Schwarzschild calcule la déformation de l'espace-temps obtenue en concentrant une masse  $M$  dans une région de rayon


$$R_S = \frac{2G_N M}{c^2}$$



Toute la masse du Soleil  $M_{\odot} \simeq 2 \times 10^{30}$  kg dans une boule de  $R_{\odot} \simeq 3$  km, pour la Terre le rayon est  $R_{\oplus} \simeq 8.9$  mm.

# Trous noirs et Albert Einstein


En 1939 Einstein explique que les trous noirs sont *incompatible* avec la réalité *physique* de sa théorie de la gravitation



Il faudra attendre les années 1950 pour que les trous noirs soient vus comme des objets astrophysiques présents dans l'Univers et observables



# Voir les trous noirs

Trou noir au centre de notre galaxie : *Sagittarius A\** d'une masse 4.1 millions fois celle du Soleil



Vu en observant la matière attirée par le trou noir ou par la déformation des étoiles et effets de lentilles gravitationnelles

# Danse des trous noirs





# Einstein et les ondes gravitationnelles

En 1936 dans un article intitulé « Do Gravitational Waves Exist? » Il argumente contre la réalité physique des ondes.

## ON GRAVITATIONAL WAVES.

BY

A. EINSTEIN and N. ROSEN.

### ABSTRACT.



The rigorous solution for cylindrical gravitational waves is given. For the convenience of the reader the theory of gravitational waves and their production, already known in principle, is given in the first part of this paper. After encountering relationships which cast doubt on the existence of *rigorous solutions for undulatory gravitational fields*, we investigate rigorously the case of cylindrical gravitational waves. It turns out that *rigorous solutions exist* and that the problem reduces to the usual cylindrical waves in euclidean space.

Einstein pose la question importante : Sont-elles des manifestations de l'espace-temps ou des ondes mathématiques de coordonnées ?

# Détection de l'onde : GW150914



Le 14 septembre 2015 LIGO détecte des ondes gravitationnelles manifestation de la vibration de l'espace-temps



Entendre les trous noirs : GW150914

## Calcul théorique de la forme des ondes

Cette découverte a été possible grâce aux calculs théoriques prédisant la forme du signal à observer

C'est une confirmation fantastique de la validité de la théorie de la relativité d'Einstein dans un régime encore non testé

# Troisième partie III

## Gravitation et mécanique quantification




# Das Lichtquant




En 1905 Einstein décrit la lumière comme une onde et un corpuscule



INTERNATIONAL  
YEAR OF LIGHT  
2015




# Diffusion Compton



$$\lambda' - \lambda = \frac{\hbar}{mc} (1 - \cos\theta)$$

L'expérience de diffusion par Arthur Compton (1923) confirme l'hypothèse d'Einstein de la quantification de la lumière et l'existence du photon

# Nécessité de quantifier la gravitation





En 1916 Einstein écrit

*À cause des mouvements intra-atomiques, l'atome doit rayonner (...) de l'énergie gravitationnelle, même en très faibles quantités.*

*Comme cela ne peut être le cas dans la nature, il apparaît alors que la théorie quantique doit modifier (...) la nouvelle théorie de la gravitation.*

# Quantum de lumière : Le photon




Le photon est la particule des ondes électromagnétiques

$$\gamma: \quad \epsilon_{\mu}^{+}, \quad \epsilon_{\mu}^{-}, \quad \text{masse} = 0$$




# Quantum d'espace-temps : Le graviton




Le graviton est la particule des ondes d'espace-temps

$$h : \quad \epsilon_{\mu\nu}^{++}, \quad \epsilon_{\mu\nu}^{--}, \quad \text{masse} = 0$$



# Gravité classique et quantique



Deux paramètres physiques :


- paramètre classique : le rayon de Schwarzschild (trou noir)

$$r_S = \frac{2G_N m}{c^2}$$

- paramètre quantique : la longueur d'onde de Compton

$$\lambda = \frac{\hbar}{mc}$$

# Gravité classique et quantique




rayon de Schwarzschild  $\times$  longueur de Compton

= longueur de Planck

$$\frac{2mG_N}{c^2} \times \frac{\hbar}{mc} = 2 \frac{\hbar G_N}{c^3} = 2 \ell_P^2 \approx 2 \times (10^{-35} \text{ m})^2$$

# Contributions quantiques ?





Une contribution classique d'ordre  $(r_S/r)^n$  a une incertitude quantique de l'ordre de la longueur d'onde de Compton

$$\lambda = \frac{\hbar}{mc}$$

$$\left(\frac{r_S}{r \pm \lambda}\right)^n \simeq \left(\frac{r_S}{r}\right)^n \mp n \left(\frac{r_S}{r}\right)^{n-1} \overbrace{\frac{r_S \lambda}{r^2}}^{2\ell_p^2} + \dots$$

# Universalité de la gravitation



La gravitation affecte les phénomènes physiques aux échelles microscopiques et macroscopiques

## Nous avons pu déterminer des corrections de gravité quantique à de la physique de basse énergie



N.E.J. Bjerrum-Bohr Niels Bohr Institute (Danemark)



John Donoghue Amherst University (USA)




Barry Holstein Amherst University (USA)



Ludovic Planté Institut de Physique Théorique, CEA (France)

# Voir la gravité quantique : déviation de la lumière




La contribution quantique dépend de la nature de la matière

$$\theta_\gamma - \theta_\varphi = \frac{8(bu^\gamma - bu^\varphi)}{\pi} \frac{G_N^2 \hbar M}{c^5 b^3}.$$

Effet numériquement très faible mais fournit, en principe, une signature de gravité quantique

# Les promesses d'une nouvelle astronomie

Avec la détection des ondes gravitationnelles on peut espérer



- ▶ Spectroscopie des trous noirs : théorème d'absence de cheveux
- ▶ Théorie de gravitation modifiée au-delà de la théorie d'Einstein
- ▶ Objets compacts exotiques
- ▶ Matière exotique et inattendue ...